


Herkenningskaart Amerikaanse brulkikker vs groene kikker

Amerikaanse brulkikker

- Geen ruglijsten over de rugzijde (foto C)
- Opvallend groot trommelvlies, vaak groter dan het oog (nog niet zo duidelijk bij jonge dieren!) (foto B)
- Mannetjes met één keelkwaakblaas (foto A)
- Nooit een groene rugstreep

Enkele keelkwaakblaas

Groot trommelvlies




Geen ruglijsten aanwezig

Groene kikkers

- Ruglijsten over hele lichaamslengte aanwezig (lengteribbels tussen de rug en flanken) (foto F)
- Trommelvlies kleiner dan oog (foto E)
- Mannetjes met twee wangkwaakblazen (foto D)
- Bijna altijd een groene rugstreep, midden over de rug

Twee wangkwaakblazen

Klein trommelvlies



Ruglijsten aanwezig

Geluid



Amerikaanse brulkikker

De mannetjes maken een laag brommend keelgeluid (als kort loeigeluid van een rund). Mannetjes roepen vaak in hun eentje. Bij het wegvluchten (onderduiken) maken brulkikkers een ijl "iep" geluidje.

Beluister de geluiden op de RAVON website onder:
soorten ► Amfibieën ► Amerikaanse brulkikker

Groene kikkers

De mannetjes maken schelle en vaak zeer gevarieerde, kwakende geluiden. Mannetjes roepen vaak met meerdere dieren tegelijk bij elkaar.

Beluister de geluiden op de RAVON website onder:
soorten ► Amfibieën ► Poelkikker
► Bastardkikker
► Meerkikker

Larven

Amerikaanse brulkikker - Larven

- Vlekkenpatroon van zwarte, zeer kleine, even grote stipjes (als speldenprikken) - zie detail foto G
- Lengte tot 15 cm (soms groter) (foto H)



Groene kikkers - Larven

- Vlekjes op staart en rug groter en variabel (foto J)
- Lengte normaliter tot 8 cm, overwinterende larven soms echter groter (foto I)



Profiel

- De Amerikaanse brulkikker is afkomstig uit Noord-Amerika, de kikkervissen (dikkoppen) zijn begin jaren negentig ingevoerd als vijver- en aquariumdieren.
- De import in de Europese Unie is inmiddels verboden vanwege schadelijke effecten van de soort
- De brulkikker plant zich voort in plantenrijke en warme wateren, die wel diep genoeg moeten zijn voor overwintering van de kikkervissen. Vaak zijn dit grote (tuin)vijvers.

Hoe te herkennen?

De kikkervissen van de brulkikker hebben twee jaar nodig om tot jonge kikker uit te groeien. Als u in het najaar nog hele grote kikkervissen in de vijver hebt is er een kans dat deze van de brulkikker zijn. Kijk voor de herkenning van de soort op de bijgeleverde herkenningskaart (z.o.z.)

Let op: de brulkikker is verwant aan onze groene kikkers, dit zijn beschermde diersoorten. Niet alle kikkers die geluid maken zijn brulkikkers. Graag foto's nemen van de kikkervissen of de kikkers om de herkenning door deskundigen te laten bevestigen.

Waarom melden?

Waarom is het belangrijk de Amerikaanse brulkikker te melden:

- De Amerikaanse brulkikker kan zich door snelle voortplanting sterk uitbreiden.
- De soort is vraatzuchtig; inheemse amfibieën worden opgegeten en verdrongen.
- Deze soort kan in de zomermaanden zorgen voor flinke geluidsoverlast.
- Daarnaast is hij vaak drager van een schimmelziekte, die wereldwijd al tot het uitsterven van meerdere amfibieënsoorten heeft geleid. Deze schimmelziekte is voor mensen en huisdieren overigens ongevaarlijk en treft alleen amfibieën.

Vanwege deze risico's behoort de Amerikaanse brulkikker tot de 10 gevaarlijkste exotische amfibieën ter wereld. Uw meldingen zijn nodig om te voorkomen dat de kikker zich verder verspreidt en grote schade aanricht aan de in Nederland voorkomende amfibieën.

Waar melden?

Waarnemingen kunt u doorgeven op www.ravon.nl

Rechtsboven op deze website site staat een knop die bij doorklikken doorverwijst naar de brulkikkerinfo, met daarop ook een invulformulier voor waarnemingen.

Meer weten?

Op donderdag 14 oktober 2010 organiseren de gemeente Peel en Maas en de Stichting RAVON een informatieavond voor de inwoners van Baarlo en omgeving over de Amerikaanse brulkikker. De avond vindt plaats in Zaal Unitas, Wilhelminastraat 11, in Baarlo van 20.15 tot 21.30 uur.

